

Сибирский лемминг (лат. *Lemmus sibiricus*) - вид рода настоящих леммингов подсемейства полёвковых. Мелкие мышевидные грызуны, прославившиеся небывалой плодовитостью и удивительными миграциями. Всего выделяют 4-8 видов этих грызунов.

Питание.

Сибирский лемминг использует в пищу в основном осоки, пушицы, злаки и зелёные мхи. В летний период 76–90% его рациона – листья, в зимний – возрастает доля потребления зеленых мхов (до отметки 30–50%), которые лемминг поедает под снегом. Так как растительная пища бедна минералами, то лемминги при случае грызут сброшенные олени рога, яичную скорлупу из птичьих гнезд. Как и все грызуны, лемминги довольно прожорливы и едят практически все свободное время.

Среда обитания, продолжительность жизни.

Распространен, в основном, в тундровой зоне Евразии (от низовьев Колымы до междуречья Северной Двины и Онеги). Встречается также на многих островах Северного Ледовитого океана. В основном, южная граница ареала совпадает с северными пределами лесотундры. Некоторые изолированные популяции населяют редкостную заболоченную тайгу Колымской низменности. Живет лемминг в норке, которую сам себе роет. Нора представляют целую сеть запутанных, извилистых ходов. Естественная продолжительность жизни этого грызуна невелика, живет лемминг всего 1-2 года.

Красная книга.

С неопределённым статусом. Необходимы специальные исследования для выяснения современного состояния этого редкого, малоизученного вида. Специальных мер охраны пока не требуется.

Значение для человека и окружающего мира.

Лемминги не представляют редкости и не приносят пользы человеку, но они, несомненно, важная часть природного равновесия тундры. Без леммингов многие виды хищных животных не могли бы существовать.

